イナビル。を処方されたみなさま、保護者のみなさまへ

深呼吸をして、リラックスした状態で吸入しましょう。 過度に強く吸入したり、長く息止めする必要はありません。



ご使用の直前に 開封してください





イナビル®は、「吸入型(ロから吸入)」のインフルエンザのお薬です

イナビルは、インフルエンザウイルスの増殖を抑えることができる、「吸入型」のお薬です。(容器内には粉状のお薬が入っています)

治療」で用いる場合 10歳以上

40mg(2容器)を1回分として吸入



2容器で1回分



これでイナビルによる 治療は終わりです

10歳未満

20mg(1容器)を1回分として吸入



1容器で1回分



これでイナビルによる 治療は終わりです

予防」で用いる場合



イナビルは、「予防」目的で使用した場合は、 保険給付されません。

10歳以上

40mg(2容器)を1回分として吸入 2容器で1回分

> これでイナビルによる 予防は終わりです

1容器1回分を 2日間 または

D及入名 イナビル収入的末期20m

吸入割

1容器を1回分として、1日1回、 2日間吸入することもできます(2日間で2容器)

10歳未満

20mg(1容器)を1回分として吸入




1容器で1回分



これでイナビルによる 予防は終わりです

吸入容器の構造(吸入時のイメージ)

吸入容器の持ち方



薬剤トレーのラベルをはがさず矢印方向に しっかりと端までスライドさせて、片方ずつ吸入します。

吸入時は、底にある空気孔を ふさがないように持ってください。 ● 「吸入型 | のお薬のメリット ●



インフルエンザウイルスは 「のど |や「気管支 |で

増殖します



吸入型のイナビルは、 「のど」や「気管支」に 直接届いて、

ウイルスの増殖を抑えます



イナビルが直接 「のど」や「気管支」に届く

※小さなお子さまの場合等は、薬剤トレーのスライドが難しいことがありますのでご協力をお願いいたします。

吸入方法の動画およびインフルエンザに関する情報は「インフル・ニュース」でご覧いただけます。

PC用webサイト

http://www.influ-news.info

スマートフォン用webサイト http://www.influ-news.info/s/ 携帯用webサイト

http://www.influ-news.info/m/



イナビルの吸入方法については、 裏面をご覧ください。



イナビルの吸入操作は、

「スライドさせて、吸入」です

薬剤トレー ①と②を、それぞれ「スライドさせて、吸入」してください。



スライドさせて (端までしっかり)



吸入

イナビルを 吸入する

前に・・・

実際の吸入容器を使って 練習することも できます

薬剤トレーを スライドさせていない 状態で吸うと、 吸う練習ができます。



リラックスした状態で、イナビル®を吸入しましょう

お薬を集める



薬剤トレーを スライドさせない状態で 軽く"トントン"と叩き、 容器内のお薬を 下に集めます。

●をスライドさせて ▶

イナビルをXXXXX20

10 2

吸入



ラベルをはがさずに 吸入口をくわえて 「ス — ッ」と大きく吸い、 2~3秒息を止めた後、 吸入口に息を 吹きかけないように スライドさせます。 ゆっくりと息を吐きます。

2をスライドさせて



次は 薬剤トレー 2 を 矢印方向へ 端までしっかりと スライドさせます。

吸入



吸入口をくわえて 「ス ----ッ」と大きく吸い、 2~3秒息を止めた後、 吸入口に息を 吹きかけないように ゆっくりと息を叶きます。

D 元の状態に戻す



薬剤トレー 1を スライドさせて、 必ず元の状態に 戻してください。

E

もう一度A~Cを繰り返してくださいお薬の吸い残しをなくすために、

イナビル 吸入時のポ 薬剤トレーを

スライドさせた状態で、 吸入容器をたたかないで ください。

BC

薬剤トレー 1 を

端までしっかりと

矢印方向へ



空気孔をふさがないで ください。



吸入口を 奥までしっかりくわえて ください。



軽く息を吐いてから 吸入口をくわえると、 スムーズに吸入できます。



下を向いたまま吸入せず、 体を起こしながら 吸入してください。



吸入後は 2~3秒間息を止め、 その後ゆっくり息を吐く ようにしてください。



ご参照 ください。

* 人によってはお薬が苦く感じる場合があります。

